FELICIDADES !! ERES ASOMBROSA !! PIDE AYUDA SI LA NECESITAS !!



POSPARTO

ALERTAS

MIENTRAS SE QUE ESTÁS ANSIOSA POR LLEGAR A CASA, QUIERO REFORZAR ALGUNAS BANDERAS ROJAS QUE DEBERÍAN ALERTARTE PARA NOTIFICAR A TU PROVEFDOR DE OBSTETRICIA.



ANSIEDAD/DEPRESIÓN Insomnio, pérdida de apetito,

DIFÍCIL VÍNCULO CON EL BEBÉ, LLANTO O IRRITABILIDAD, FALTA DE CONCENTRACIÓN LA DEPRESIÓN POSPARTO QUE NO SE TRATA PUEDE SER GRAVE. PIDA AYUDA A SU FAMILIA, AMIGOS O PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA. POR LO GENERAL, SE TRATA CON MEDICAMENTOS O ASESORAMIENTO.

LOQUIA

AUMENTO DEL SANGRADO ROJO BRILLANTE O LOQUIOS MAL OLORES SANGRADO EXCESIVO (SATURAR UNA ALMOHADILLA EN MENOS DE 1 HORA), COÁGULOS ANORMALMENTE GRANDES, DEL TAMAÑO DE UNA PELOTA DE GOLF, SECAR CON MAL OLOR, CALAMBRES SEVEROS, SENTIMIENTO DE MAREADO, VISIÓN BORROSA

E

HIPERTENSION ELEVADA

SUPERIOR A 140/90
CONSISTENTE, ADEMÁS DE
DOLOR DE CABEZA O
ALTERACIONES VISUALES

LA PREECLAMPSIA POSPARTO ES REAL. PUEDES TENERLO AUNQUE NO TUVISTE NINGÚN PROBLEMA DURANTE EL EMBARAZO. SSX: DOLOR DE CABEZA,

SSX: DOLOR DE CABEZA, ALTERACIONES VISUALES, PA ELEVADA

R

ENROIECIMIENTO

CON HINCHAZÓN O DOLOR, EN SENOS, PIERNAS Y/O INCISIÓN (SI CORRESPONDE) EN UN MAMA, O EN AMBOS, PODRÍA HABER MASTITIS. EN LA PIERNA O EN AMBAS PODRÍA SER UNA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA.

T

TEMPERATURA > 100.4
O SÍNTOMAS SIMILARES A LA
GRIPE, COMO ESCALÍFICOS,
FATIGA, DOLOR CORPORAL,

CON DOLOR ABDOMINAL Y LOQUIOS MALOLIENTES, PODRÍA SER ENDOMETRITIS. SI TIENE DOLOR EN LOS SENOS, PODRÍA DEBERSE A LA BAJADA DE LECHE O A UNA MASTITIS.

CON SÍNTOMAS URINARIOS, PODRÍA TRATARSE DE UNA INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO.

S

SUDORACIÓN ESTÓMAGO SEVERO

DOLORES O DIFICULTAD

PARA RESPIRAR

DOLOR OUE NO SE ALIVIA

CON ANALGÉSICOS

SI BIEN PODRÍAN SER "DOLORES POSTERIORES" NORMALES, PODRÍA SER UNA INFECCIÓN (ENDOMETRITIS O UTI) O PREECLAMPSIA (PARTE SUPERIOR DERECHA DEL ABDOMEN).